

**Silva AVM responde**

Silva AVM responds

Alba Valéria Machado da Silva <sup>1</sup><sup>1</sup> Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, Brasil.**Correspondência**

A. V. M. Silva  
 Laboratório de Imunomodulação,  
 Departamento de Protozoologia,  
 Instituto Oswaldo Cruz, Fundação Oswaldo Cruz.  
 Av. Brasil 4365, Pavilhão Carlos Chagas,  
 3º andar, Rio de Janeiro, RJ 21045-900, Brasil.  
 albavmsilva@click21.com.br

Agradecemos as considerações feitas em relação a aspectos importantes da leishmaniose visceral canina, e também à possibilidade de esclarecer as questões referentes aos supostos equívocos “*corriqueiros*” cometidos, mencionados na carta intitulada *Infecção, Soropositividade e Doença: Qual a Diferença?*

Pelo fato de se tratar de uma nota prévia e por este motivo haver uma restrição no número de palavras do manuscrito, algumas informações referentes à metodologia não foram incluídas no texto.

Com relação à referida alta prevalência de cães infectados pela *Leishmania chagasi*, aparentemente obtida apenas pelos resultados da IFA, ressaltamos que embora não mencionados, outros procedimentos referentes ao acompanhamento dos animais foram feitos, tais como: IFA e Western blot para *Trypanosoma cruzi*; pesquisa de hematozoários por meio de exames a fresco e hemocultivos; acompanhamento clínico por um período de cinco anos, sendo bimestral no último ano, como também a confirmação do diagnóstico por PCR e “*imprints*” em alguns animais; além disso, no grupo de cães que fez parte desse acompanhamento, todos tinham idade superior a cinco meses, não sendo possível que os anticorpos detectados fossem os maternos.

Com relação à necessidade de detalhamentos estatísticos, o reconhecimento precoce dos peptídeos 29, 32 e 68.5kDa até oito meses antes da soroconversão pela IFA por si só já comprovam uma maior sensibilidade do Western blot e ao nosso ver estatística para esse tipo de resultados é desnecessária.

No que se refere à falta de uma discussão mais aprofundada sobre a ocorrência de cães assintomáticos com títulos maiores ou iguais a 1/160, existem vários artigos científicos publicados nos últimos anos que sugerem, sendo que alguns deles até afirmam categoricamente que não há correlação direta entre títulos sorológicos e sintomatologia na leishmaniose visceral.

Informamos que grande parte das respostas para as questões que foram levantadas poderá ser obtida em um artigo que será em breve publicado, constando de um estudo detalhado do presente assunto.

Recebido em 08/Jul/2005

Aprovado em 25/Jul/2005

**Tributo a Sir Richard Doll**

A tribute to Sir Richard Doll

Eduardo Faerstein <sup>1</sup><sup>1</sup> Instituto de Medicina Social, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brasil.**Correspondência**

E. Faerstein  
 Instituto de Medicina Social,  
 Universidade do Estado do Rio de Janeiro.  
 Rua São Francisco Xavier 524, 7º andar,  
 Rio de Janeiro, RJ 20550-900, Brasil.  
 eduardof@umich.edu

Sr. Editor,

Sir Richard Doll, um dos maiores ícones da epidemiologia mundial, faleceu no dia 24 de julho último, aos 92 anos de idade. Aspectos de sua longa e rica trajetória merecem registro nesta revista.

Seus trabalhos mais conhecidos são aqueles que resultaram no estabelecimento do papel do fumo na etiologia do câncer de pulmão. Essa foi, sem dúvida, uma das contribuições científicas de maior impacto sobre a saúde populacional na segunda metade do século XX. Quatro anos após a primeira publicação sobre o tema <sup>1</sup>, o Ministro da Saúde britânico anunciou na TV (segundo relatos, fumando desbragadamente) que endossava o nexo causal proposto <sup>2</sup>. Recentemente, Doll sumariou evidências acumuladas ao longo de 50 anos de acompanhamento da coorte de médicos ingleses iniciada na época <sup>3</sup>.

Muitas outras contribuições suas foram expressivas, abrangendo estudos de várias condições de saúde, além de questões conceituais, metodológicas e éticas. Alguns aspectos de sua produção acadêmica, entretanto, ainda aguardam reconhecimento mais amplo. Por exemplo, a observação de efeitos carcinogênicos lineares da radiação ionizante (i.e. não restritos à exposição a doses elevadas) teve amplo impacto sobre o modo de compreender e lidar com diversas exposições ocupacionais e ambientais.

Além do câncer de pulmão e da leucemia, suas pesquisas epidemiológicas tiveram como objetos doenças como a úlcera péptica, asma, doença coronariana, doença de Alzheimer, HIV/AIDS, eclampsia, anemia aplásica, anomalias congênitas, neoplasias de estômago, colo uterino, bexiga e rim. Em relação a algumas dessas condições, Doll conduziu análises de suas tendências temporais e distribuição geográfica. Estudou também os efeitos da exposição ao asbesto, à poluição atmosférica, à fluoretação da água e ao fumo passivo, assim como ao uso de contraceptivos orais e de outros medicamentos. Publicou, ademais, reflexões teóricas sobre a carcinogênese e sobre a vigilância epidemiológica, e sobre aspecto éticos da pesquisa científica.

Durante seus últimos seis meses de vida, Sir Richard Doll publicou outros seis artigos, abrangendo os efeitos da exposição ocupacional à radiação ionizante <sup>4</sup>, as tendências temporais do câncer no Reino Unido <sup>5</sup>, resultados relativos a duas outras coortes ocupacionais <sup>6,7</sup>, resultados relativos aos efeitos do consumo de álcool na coorte de médicos ingleses <sup>8</sup>, e uma meta-análise sobre os efeitos do gás radônio sobre a ocorrência do câncer de pulmão <sup>9</sup>. Foi um semestre especialmente emblemático de sua produtiva existência, deve-se notar.