

**ERRATA / ERRATUM**

No artigo “Avaliação da resposta inicial de desenvolvimento de ensaios clínicos para COVID-19 no Brasil”, DOI: 10.1590/1980-549720200104, publicado no periódico *Rev bras epidemiol.* 2020; 23: e200104. Na página 7, Tabela 1.

**Onde se lia:**

Tabela 1. Características dos protocolos de pesquisa disponíveis nas bases de dados de registro de estudos clínicos para COVID-19 em desenvolvimento no Brasil até maio 2020.

Intervenções para tratamento ou profilaxia de COVID-19 (n=22)		n	(%)
Desenho do estudo	Estudo clínico randomizado	18	(82)
	Estudo clínico não randomizado	4	(18)
Fase da pesquisa	Fase 1	3	(14)
	Fase 2	5	(23)
	Fase 3	8	(36)
	Fase 4	2	(9)
	NM	4	(18)
Mascaramento	Não mascarado	13	(59)
	Unicego	1	(5)
	Duplo-cego	2	(9)
	Quadruplo-cego	6	(27)
Grupo Controle	Comparador placebo/tratamento padrão	13	(59)
Multicêntrico <sup>a</sup>	Sim	7	(32)
Local de recrutamento	Hospital	16	(73)
	Ambulatório	2	(9)
	NM	4	(18)
Cálculo do Poder <sup>b</sup> Cenário de grande tamanho de efeito (RR = 0,4; incidências: 10 vs. 25%)	Alto $\geq 90\%$ <sup>c</sup>	1	(5%)
	Bom (< 90 e $\geq 80\%$ ) <sup>d</sup>	1	(5%)
	Baixo (< 80 e > 50%) <sup>e</sup>	2	(9%)
	Muito baixo (< 50%) <sup>f</sup>	17	(81%)
Cálculo do Poder <sup>b</sup> Cenário de moderado tamanho de efeito (RR = 0,6; incidência: 7,2 vs. 12%)	Alto $\geq 90\%$ <sup>g</sup>	11	(52%)
	Bom (< 90 e $\geq 80\%$ ) <sup>h</sup>	1	(5%)
	Baixo (< 80 e > 50%) <sup>i</sup>	3	(14%)
	Muito baixo (< 50%) <sup>j</sup>	6	(29%)
Intervenções para tratamento de COVID-19 (n = 21)			
Critério inclusão - COVID-19	Diagnóstico confirmado (teste +)	5	(24)
	Diagnóstico suspeito - Suspeita clínica ou teste +	12	(57)
	Diagnóstico suspeito - Apenas suspeita clínica	4	(19)
Gravidade dos pacientes incluídos	Hospitalizado moderado ou grave	4	(19)
	Hospitalizado grave	5	(24)
	Hospitalizado moderado	1	(5)
	Hospitalizado inespecífico	6	(28)
	Não hospitalizado	1	(5)
	NM	4	(19)
Uso de desfechos importantes para COVID-19 <sup>k</sup>	Como desfecho primário	8	(38)
	Entre os desfechos secundários	18	(86)

<sup>a</sup>Mais que um centro de recrutamento; <sup>b</sup>cálculo do poder não incluiu o estudo da Organização Mundial da Saúde, pelas limitações de acesso do tamanho amostral em cada braço; <sup>c</sup>tamanho de amostra (n) = 1.986; <sup>d</sup>n = 130; <sup>e</sup>n entre 400 e 1.000; <sup>f</sup>n entre 20 e 600; <sup>g</sup>n entre 630 e 1.968; <sup>h</sup>n entre 200 e 290; <sup>i</sup>n entre 66 e 210; <sup>j</sup>n entre 22 e 50; <sup>k</sup>desfechos importantes conforme consenso publicado na iniciativa *Core Outcome Measures in Effectiveness Trials* para pacientes hospitalizados; NM: não menciona; RR: risco relativo.

**Leia-se:**

Tabela 1. Características dos protocolos de pesquisa disponíveis nas bases de dados de registro de estudos clínicos para COVID-19 em desenvolvimento no Brasil até maio 2020.

Intervenções para tratamento ou profilaxia de COVID-19 (n=22)		n	(%)
Desenho do estudo	Estudo clínico randomizado	18	(82)
	Estudo clínico não randomizado	4	(18)
Fase da pesquisa	Fase 1	3	(14)
	Fase 2	5	(23)
	Fase 3	8	(36)
	Fase 4	2	(9)
	NM	4	(18)
Mascaramento	Não mascarado	13	(59)
	Unicego	1	(5)
	Duplo-cego	2	(9)
	Quadruplo-cego	6	(27)
Grupo Controle	Comparador placebo/tratamento padrão	13	(59)
Multicêntrico <sup>a</sup>	Sim	7	(32)
Local de recrutamento	Hospital	16	(73)
	Ambulatório	2	(9)
	NM	4	(18)
Cálculo do Poder <sup>b</sup> Cenário de moderado tamanho de efeito (RR = 0,6; incidência: 7,2 vs. 12%)	Alto $\geq 90\%$ <sup>c</sup>	1	(5%)
	Bom (< 90 e $\geq 80\%$ ) <sup>d</sup>	1	(5%)
	Baixo (< 80 e > 50%) <sup>e</sup>	2	(9%)
	Muito baixo (< 50%) <sup>f</sup>	17	(81%)
Cálculo do Poder <sup>b</sup> Cenário de grande tamanho de efeito (RR = 0,4; incidências: 10 vs. 25%)	Alto $\geq 90\%$ <sup>g</sup>	10	(48%)
	Bom (< 90 e $\geq 80\%$ ) <sup>h</sup>	2	(9,5%)
	Baixo (< 80 e > 50%) <sup>i</sup>	2	(9,5%)
	Muito baixo (< 50%) <sup>j</sup>	7	(33%)
Intervenções para tratamento de COVID-19 (n = 21)			
Critério inclusão - COVID-19	Diagnóstico confirmado (teste +)	5	(24)
	Diagnóstico suspeito - Suspeita clínica ou teste +	12	(57)
	Diagnóstico suspeito - Apenas suspeita clínica	4	(19)
Gravidade dos pacientes incluídos	Hospitalizado moderado ou grave	4	(19)
	Hospitalizado grave	5	(24)
	Hospitalizado moderado	1	(5)
	Hospitalizado inespecífico	6	(28)
	Não hospitalizado	1	(5)
	NM	4	(19)
Uso de desfechos importantes para COVID-19 <sup>k</sup>	Como desfecho primário	8	(38)
	Entre os desfechos secundários	18	(86)

<sup>a</sup>Mais que um centro de recrutamento; <sup>b</sup>cálculo do poder não incluiu o estudo da Organização Mundial da Saúde, pelas limitações de acesso do tamanho amostral em cada braço; <sup>c</sup>tamanho de amostra (n) = 1.986; <sup>d</sup>n = 130; <sup>e</sup>n entre 400 e 1.000; <sup>f</sup>n entre 20 e 600; <sup>g</sup>n entre 630 e 1.968; <sup>h</sup>n entre 200 e 290; <sup>i</sup>n entre 66 e 210; <sup>j</sup>n entre 22 e 50; <sup>k</sup>desfechos importantes conforme consenso publicado na iniciativa *Core Outcome Measures in Effectiveness Trials* para pacientes hospitalizados; NM: não menciona; RR: risco relativo.

