

Revista de Saúde Pública Volume 40(1), 2006

Tabela/ Table - Página/ Page 44

Por um erro de digitação as primeiras duas linhas da Tabela 4 tiveram suas percentagens alteradas. Substituir a Tabela conforme abaixo/ *Due to a typing error, the percentages of the first two rows in Table 4 are incorrect. Please replace the Table as follows:*

Tabela antiga/ *Former table:*

Table 4 - Follow up rates in the 2004-5 visit, according to baseline characteristics of the cohort. Pelotas, Southern Brazil.

Variable	Original cohort N (%)	% located*	P**
Gender			0.18
Boys	2,580 (49.2%)	86.9	
Girls	2,667 (50.8%)	88.1	
Family income (minimum wages)			<0.001
≤1	967 (18.4%)	88.3	
1.1-3.0	2,260 (43.1%)	88.7	
3.1-6.0	1,204 (22.9%)	88.9	
6.1-10.0	433 (8.3%)	79.9	
>10.0	385 (7.3%)	82.6	
Maternal schooling at birth (years)			<0.001
0	134 (2.6%)	82.1	
1-4	1,338 (25.5%)	88.7	
5-8	2,424 (46.2%)	89.9	
≥9	1,350 (25.7%)	82.5	
Birth weight (g)			0.16
<2,500	510 (9.8%)	89.8	
2,500-3,499	3,361 (64.2%)	86.9	
≥3,500	1,361 (26.0%)	87.9	
Overall	5,249 (100.0%)	87.5	

*Including 141 deaths

**Chi-square test

Tabela atual/ *Correct table:*

Table 4 - Follow up rates in the 2004-5 visit, according to baseline characteristics of the cohort. Pelotas, Southern Brazil.

Variable	Original cohort N (%)	% located*	P**
Gender			0.13
Boys	2,606 (49.7%)	86.8	
Girls	2,642 (50.3%)	88.2	
Family income (minimum wages)			<0.001
≤1	967 (18.4%)	88.3	
1.1-3.0	2,260 (43.1%)	88.7	
3.1-6.0	1,204 (22.9%)	88.9	
6.1-10.0	433 (8.3%)	79.9	
>10.0	385 (7.3%)	82.6	
Maternal schooling at birth (years)			<0.001
0	134 (2.6%)	82.1	
1-4	1,338 (25.5%)	88.7	
5-8	2,424 (46.2%)	89.9	
≥9	1,350 (25.7%)	82.5	
Birth weight (g)			0.16
<2,500	510 (9.8%)	89.8	
2,500-3,499	3,361 (64.2%)	86.9	
≥3,500	1,361 (26.0%)	87.9	
Overall	5,249 (100.0%)	87.5	

*Including 141 deaths

**Chi-square test