

Impacto del tabaquismo en la mortalidad en México

Cuadro I
**TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA
DEL CORAZÓN† EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS
DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA.
MÉXICO, 1990 Y 2000**

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 |
| Total | 11.7 | 11.0 | 5.4 | 5.5 |
| Aguascalientes | 8.4 | 8.5 | 4.8 | 3.8 |
| Baja California | 27.3 | 22.9 | 8.3 | 7.8 |
| Baja California Sur | 17.4 | 28.4 | 1.4 | 10.9 |
| Campeche | 8.1 | 10.9 | 6.0 | 4.8 |
| Coahuila | 16.9 | 17.4 | 8.6 | 9.5 |
| Colima | 12.0 | 15.7 | 3.3 | 5.5 |
| Chiapas | 6.1 | 6.5 | 3.1 | 4.3 |
| Chihuahua | 21.5 | 18.2 | 9.3 | 11.1 |
| Distrito Federal | 13.8 | 12.5 | 6.8 | 5.3 |
| Durango | 11.0 | 11.2 | 5.5 | 4.6 |
| Guanajuato | 8.0 | 8.6 | 4.5 | 4.0 |
| Guerrero | 4.5 | 6.3 | 3.2 | 3.9 |
| Hidalgo | 8.6 | 6.2 | 4.5 | 2.7 |
| Jalisco | 12.7 | 10.9 | 6.7 | 6.0 |
| México | 9.6 | 9.4 | 4.8 | 5.1 |
| Michoacán | 7.9 | 7.7 | 4.4 | 4.2 |
| Morelos | 11.2 | 9.8 | 3.7 | 3.9 |
| Nayarit | 11.5 | 7.5 | 4.9 | 6.6 |
| Nuevo León | 21.8 | 17.3 | 9.3 | 7.7 |
| Oaxaca | 4.9 | 7.0 | 3.3 | 3.7 |
| Puebla | 6.8 | 7.3 | 3.5 | 3.9 |
| Querétaro | 12.0 | 9.6 | 3.7 | 4.6 |
| Quintana Roo | 7.0 | 10.2 | 1.1 | 5.1 |
| San Luis Potosí | 9.6 | 6.9 | 3.7 | 6.2 |
| Sinaloa | 13.5 | 13.9 | 7.5 | 8.6 |
| Sonora | 27.1 | 22.1 | 8.7 | 9.7 |
| Tabasco | 7.6 | 6.8 | 4.5 | 3.6 |
| Tamaulipas | 18.9 | 15.3 | 7.6 | 7.8 |
| Tlaxcala | 5.3 | 7.4 | 1.7 | 1.8 |
| Veracruz | 8.8 | 8.7 | 4.3 | 4.4 |
| Yucatán | 10.2 | 10.5 | 3.7 | 5.1 |
| Zacatecas | 6.5 | 8.9 | 4.2 | 5.3 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro II
**TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA
DEL CORAZÓN† EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS
DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA.
MÉXICO, 1990 Y 2000**

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|-------|---------|------|
| | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 |
| Total | 66.4 | 72.9 | 53.8 | 62.7 |
| Aguascalientes | 64.3 | 73.3 | 54.7 | 52.5 |
| Baja California | 114.2 | 110.4 | 84.9 | 84.2 |
| Baja California Sur | 77.3 | 94.2 | 56.9 | 63.5 |
| Campeche | 54.7 | 75.4 | 42.0 | 57.0 |
| Coahuila | 92.8 | 89.4 | 58.3 | 74.7 |
| Colima | 71.1 | 82.6 | 49.5 | 89.3 |
| Chiapas | 45.8 | 50.2 | 35.1 | 40.2 |
| Chihuahua | 96.8 | 105.7 | 79.5 | 84.0 |
| Distrito Federal | 93.1 | 88.2 | 87.1 | 85.7 |
| Durango | 60.5 | 71.4 | 45.5 | 50.2 |
| Guanajuato | 59.0 | 65.0 | 43.0 | 53.0 |
| Guerrero | 30.6 | 45.8 | 18.3 | 37.5 |
| Hidalgo | 42.5 | 46.0 | 41.0 | 45.3 |
| Jalisco | 76.4 | 81.4 | 57.9 | 68.7 |
| México | 53.3 | 64.7 | 47.4 | 61.9 |
| Michoacán | 42.9 | 60.3 | 34.0 | 47.3 |
| Morelos | 68.4 | 59.9 | 48.7 | 51.4 |
| Nayarit | 70.0 | 79.3 | 50.2 | 62.8 |
| Nuevo León | 107.3 | 94.2 | 81.0 | 83.4 |
| Oaxaca | 29.9 | 44.7 | 23.9 | 36.9 |
| Puebla | 41.0 | 51.3 | 35.1 | 43.3 |
| Querétaro | 41.5 | 61.5 | 40.2 | 53.9 |
| Quintana Roo | 42.8 | 61.5 | 24.3 | 59.0 |
| San Luis Potosí | 59.5 | 71.0 | 49.3 | 60.4 |
| Sinaloa | 75.6 | 84.7 | 52.4 | 73.3 |
| Sonora | 116.4 | 110.8 | 85.1 | 85.5 |
| Tabasco | 65.9 | 69.2 | 62.2 | 55.4 |
| Tamaulipas | 98.0 | 95.4 | 70.2 | 81.6 |
| Tlaxcala | 43.9 | 47.3 | 33.3 | 25.4 |
| Veracruz | 54.8 | 66.2 | 45.7 | 54.8 |
| Yucatán | 77.7 | 86.9 | 61.5 | 75.6 |
| Zacatecas | 44.0 | 64.1 | 34.2 | 55.3 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro III
TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA† EN POBLACIÓN
DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 |
| Total | 2.3 | 1.9 | 1.4 | 1.3 |
| Aguascalientes | 1.7 | 3.4 | 2.2 | 1.7 |
| Baja California | 1.5 | 1.6 | 1.3 | 1.1 |
| Baja California Sur | 1.3 | 1.2 | 1.5 | 1.6 |
| Campeche | 1.4 | 2.3 | 1.2 | 1.0 |
| Coahuila | 2.0 | 2.5 | 1.7 | 0.5 |
| Colima | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.7 |
| Chiapas | 1.5 | 1.3 | 0.5 | 1.5 |
| Chihuahua | 2.5 | 2.4 | 1.2 | 2.0 |
| Distrito Federal | 3.2 | 2.0 | 1.8 | 1.1 |
| Durango | 1.4 | 2.7 | 1.6 | 1.3 |
| Guanajuato | 1.8 | 2.3 | 1.4 | 1.1 |
| Guerrero | 1.1 | 1.2 | 0.5 | 0.9 |
| Hidalgo | 2.3 | 1.1 | 1.3 | 1.0 |
| Jalisco | 3.5 | 2.3 | 2.8 | 1.8 |
| México | 3.2 | 2.0 | 1.9 | 1.8 |
| Michoacán | 2.5 | 2.0 | 1.1 | 1.4 |
| Morelos | 1.6 | 1.8 | 0.2 | 0.9 |
| Nayarit | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 0.8 |
| Nuevo León | 3.0 | 1.9 | 1.1 | 1.6 |
| Oaxaca | 0.7 | 1.3 | 1.0 | 0.5 |
| Puebla | 1.4 | 1.1 | 1.5 | 1.2 |
| Querétaro | 1.8 | 1.2 | 0.8 | 1.3 |
| Quintana Roo | 2.4 | 2.0 | 0.0 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 1.8 | 1.5 | 1.6 | 1.0 |
| Sinaloa | 2.9 | 2.9 | 0.5 | 1.0 |
| Sonora | 3.8 | 3.1 | 1.7 | 1.6 |
| Tabasco | 1.8 | 1.0 | 0.7 | 1.2 |
| Tamaulipas | 2.5 | 2.3 | 0.9 | 0.8 |
| Tlaxcala | 2.1 | 0.2 | 0.8 | 1.6 |
| Veracruz | 1.6 | 1.9 | 1.0 | 1.6 |
| Yucatán | 1.1 | 0.9 | 1.0 | 0.6 |
| Zacatecas | 2.0 | 2.3 | 1.0 | 1.3 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro IV
TASA* DE MORTALIDAD POR ENFERMEDAD PULMONAR
OBSTRUCTIVA CRÓNICA† EN POBLACIÓN DE 65
Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 |
| Total | 34.5 | 36.1 | 21.2 | 22.8 |
| Aguascalientes | 45.4 | 54.2 | 23.9 | 44.1 |
| Baja California | 26.7 | 27.1 | 16.9 | 16.2 |
| Baja California Sur | 36.0 | 45.8 | 14.6 | 10.6 |
| Campeche | 17.6 | 26.0 | 11.5 | 10.5 |
| Coahuila | 47.2 | 39.3 | 23.2 | 18.6 |
| Colima | 37.7 | 34.9 | 25.7 | 23.7 |
| Chiapas | 15.3 | 20.0 | 9.7 | 17.1 |
| Chihuahua | 38.0 | 48.7 | 18.8 | 22.2 |
| Distrito Federal | 45.2 | 34.6 | 28.8 | 22.9 |
| Durango | 50.4 | 48.4 | 20.7 | 31.5 |
| Guanajuato | 43.7 | 47.7 | 27.2 | 28.1 |
| Guerrero | 12.3 | 21.2 | 7.6 | 10.8 |
| Hidalgo | 20.5 | 24.7 | 19.0 | 21.4 |
| Jalisco | 42.3 | 48.0 | 28.9 | 32.7 |
| México | 41.1 | 43.0 | 29.3 | 30.7 |
| Michoacán | 35.0 | 43.5 | 24.2 | 26.2 |
| Morelos | 38.5 | 44.0 | 17.8 | 19.8 |
| Nayarit | 26.3 | 40.2 | 10.0 | 21.5 |
| Nuevo León | 37.8 | 34.5 | 22.7 | 22.0 |
| Oaxaca | 17.0 | 20.7 | 9.8 | 13.4 |
| Puebla | 29.7 | 26.5 | 17.2 | 17.1 |
| Querétaro | 37.6 | 44.2 | 20.3 | 30.3 |
| Quintana Roo | 24.2 | 26.1 | 20.3 | 17.5 |
| San Luis Potosí | 32.1 | 33.1 | 17.2 | 21.5 |
| Sinaloa | 39.9 | 42.9 | 15.0 | 17.5 |
| Sonora | 54.5 | 43.5 | 22.8 | 17.0 |
| Tabasco | 31.4 | 32.0 | 18.1 | 23.2 |
| Tamaulipas | 46.4 | 29.2 | 22.3 | 17.2 |
| Tlaxcala | 26.7 | 32.3 | 22.0 | 25.0 |
| Veracruz | 17.9 | 23.8 | 14.0 | 21.3 |
| Yucatán | 23.4 | 30.2 | 15.8 | 13.0 |
| Zacatecas | 37.3 | 61.9 | 18.8 | 30.0 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro V
TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA
BRONQUIOS Y PULMÓN† EN POBLACIÓN DE 40 A 64
AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA.
MÉXICO, 1990 Y 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 |
| Total | 2.8 | 2.2 | 1.2 | 1.0 |
| Aguascalientes | 2.0 | 0.9 | 2.6 | 1.5 |
| Baja California | 4.5 | 2.5 | 1.5 | 1.6 |
| Baja California Sur | 6.3 | 2.8 | 0.7 | 1.4 |
| Campeche | 1.2 | 2.3 | 0.6 | 1.1 |
| Coahuila | 4.9 | 4.2 | 2.3 | 1.0 |
| Colima | 3.6 | 4.9 | 1.5 | 0.8 |
| Chiapas | 0.7 | 0.9 | 0.5 | 1.4 |
| Chihuahua | 5.2 | 3.1 | 2.4 | 1.5 |
| Distrito Federal | 3.2 | 1.6 | 1.2 | 0.9 |
| Durango | 3.0 | 2.3 | 0.9 | 1.4 |
| Guanajuato | 2.5 | 2.0 | 0.8 | 1.2 |
| Guerrero | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 1.0 |
| Hidalgo | 0.9 | 1.3 | 1.2 | 0.4 |
| Jalisco | 3.4 | 2.1 | 1.7 | 1.4 |
| México | 1.5 | 1.5 | 1.1 | 0.7 |
| Michoacán | 2.2 | 2.2 | 0.9 | 1.0 |
| Morelos | 3.5 | 1.5 | 0.6 | 1.2 |
| Nayarit | 3.4 | 4.7 | 1.1 | 0.3 |
| Nuevo León | 5.0 | 4.1 | 2.1 | 1.4 |
| Oaxaca | 0.9 | 1.1 | 0.5 | 0.4 |
| Puebla | 1.1 | 1.0 | 0.7 | 0.6 |
| Querétaro | 0.6 | 1.0 | 0.7 | 0.7 |
| Quintana Roo | 2.2 | 1.9 | 1.1 | 0.7 |
| San Luis Potosí | 1.6 | 1.9 | 0.7 | 1.1 |
| Sinaloa | 7.3 | 4.9 | 1.9 | 0.9 |
| Sonora | 9.2 | 7.0 | 2.6 | 1.8 |
| Tabasco | 1.7 | 3.1 | 0.6 | 0.6 |
| Tamaulipas | 4.7 | 5.1 | 1.5 | 0.9 |
| Tlaxcala | 0.3 | 0.6 | 1.0 | 1.0 |
| Veracruz | 2.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 |
| Yucatán | 2.2 | 1.7 | 0.5 | 0.4 |
| Zacatecas | 3.4 | 1.6 | 1.1 | 0.7 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país
Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro VI
TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA
BRONQUIOS Y PULMÓN† EN POBLACIÓN DE 65
Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
FEDERATIVA. MÉXICO, 1990 Y 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | 1990 | 2000 | 1990 | 2000 |
| Total | 13.7 | 12.8 | 4.9 | 5.0 |
| Aguascalientes | 13.6 | 13.8 | 12.6 | 8.8 |
| Baja California | 22.2 | 16.8 | 8.9 | 7.5 |
| Baja California Sur | 32.4 | 34.7 | 1.6 | 8.2 |
| Campeche | 11.7 | 8.0 | 1.9 | 4.6 |
| Coahuila | 23.9 | 19.8 | 8.4 | 5.6 |
| Colima | 12.9 | 15.2 | 4.8 | 6.3 |
| Chiapas | 6.5 | 8.8 | 2.4 | 3.8 |
| Chihuahua | 27.6 | 19.2 | 8.5 | 10.0 |
| Distrito Federal | 12.7 | 9.9 | 5.4 | 5.0 |
| Durango | 14.3 | 17.5 | 7.8 | 3.2 |
| Guanajuato | 11.2 | 11.5 | 4.5 | 5.1 |
| Guerrero | 5.6 | 6.6 | 1.4 | 2.8 |
| Hidalgo | 4.9 | 5.1 | 2.4 | 2.3 |
| Jalisco | 17.8 | 16.7 | 6.6 | 7.7 |
| México | 7.8 | 7.8 | 3.6 | 3.1 |
| Michoacán | 15.7 | 13.3 | 4.9 | 6.1 |
| Morelos | 11.7 | 9.4 | 4.1 | 4.0 |
| Nayarit | 21.6 | 20.5 | 3.8 | 7.5 |
| Nuevo León | 28.0 | 22.5 | 11.9 | 6.5 |
| Oaxaca | 5.5 | 5.0 | 1.4 | 2.1 |
| Puebla | 6.7 | 4.9 | 1.9 | 3.0 |
| Querétaro | 4.5 | 8.3 | 2.8 | 5.3 |
| Quintana Roo | 13.0 | 5.2 | 2.0 | 7.6 |
| San Luis Potosí | 10.0 | 13.1 | 5.3 | 4.1 |
| Sinaloa | 29.7 | 33.0 | 6.4 | 6.7 |
| Sonora | 34.8 | 30.6 | 8.4 | 10.2 |
| Tabasco | 7.3 | 12.3 | 2.5 | 4.6 |
| Tamaulipas | 19.8 | 18.5 | 6.2 | 5.6 |
| Tlaxcala | 7.7 | 1.8 | 2.1 | 1.9 |
| Veracruz | 7.9 | 10.6 | 3.9 | 4.1 |
| Yucatán | 12.1 | 9.0 | 2.8 | 2.7 |
| Zacatecas | 15.4 | 15.1 | 5.8 | 5.6 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162
Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país
Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990 y 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro VII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN† EN POBLACIÓN
DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 5 213 | 11.7 | 2 487 | 5.4 |
| Aguascalientes | 31 | 8.4 | 17 | 4.8 |
| Baja California | 257 | 27.3 | 79 | 8.3 |
| Baja California Sur | 30 | 17.4 | 4 | 1.4 |
| Campeche | 26 | 8.1 | 15 | 6.0 |
| Coahuila | 194 | 16.9 | 94 | 8.6 |
| Colima | 31 | 12.0 | 9 | 3.3 |
| Chiapas | 85 | 6.1 | 40 | 3.1 |
| Chihuahua | 326 | 21.5 | 130 | 9.3 |
| Distrito Federal | 667 | 13.8 | 355 | 6.8 |
| Durango | 79 | 11.0 | 49 | 5.5 |
| Guanajuato | 177 | 8.0 | 84 | 4.5 |
| Guerrero | 70 | 4.5 | 45 | 3.2 |
| Hidalgo | 96 | 8.6 | 47 | 4.5 |
| Jalisco | 364 | 12.7 | 203 | 6.7 |
| México | 419 | 9.6 | 230 | 4.8 |
| Michoacán | 152 | 7.9 | 86 | 4.4 |
| Morelos | 80 | 11.2 | 26 | 3.7 |
| Nayarit | 59 | 11.5 | 27 | 4.9 |
| Nuevo León | 413 | 21.8 | 176 | 9.3 |
| Oaxaca | 89 | 4.9 | 65 | 3.3 |
| Puebla | 168 | 6.8 | 83 | 3.5 |
| Querétaro | 61 | 12.0 | 20 | 3.7 |
| Quintana Roo | 17 | 7.0 | 1 | 1.1 |
| San Luis Potosí | 104 | 9.6 | 42 | 3.7 |
| Sinaloa | 161 | 13.5 | 86 | 7.5 |
| Sonora | 285 | 27.1 | 96 | 8.7 |
| Tabasco | 52 | 7.6 | 36 | 4.5 |
| Tamaulipas | 243 | 18.9 | 101 | 7.6 |
| Tlaxcala | 22 | 5.3 | 7 | 1.7 |
| Veracruz | 314 | 8.8 | 172 | 4.3 |
| Yucatán | 93 | 10.2 | 32 | 3.7 |
| Zacatecas | 48 | 6.5 | 30 | 4.2 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro VIII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN† EN POBLACIÓN
DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD
FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|-------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 10 469 | 66.4 | 10 040 | 53.8 |
| Aguascalientes | 85 | 64.3 | 87 | 54.7 |
| Baja California | 330 | 114.2 | 277 | 84.9 |
| Baja California Sur | 43 | 77.3 | 35 | 56.9 |
| Campeche | 56 | 54.7 | 44 | 42.0 |
| Coahuila | 346 | 92.8 | 251 | 58.3 |
| Colima | 66 | 71.1 | 52 | 49.5 |
| Chiapas | 219 | 45.8 | 178 | 35.1 |
| Chihuahua | 456 | 96.8 | 423 | 79.5 |
| Distrito Federal | 1,572 | 93.1 | 2,012 | 87.1 |
| Durango | 161 | 60.5 | 134 | 45.5 |
| Guanajuato | 468 | 59.0 | 398 | 43.0 |
| Guerrero | 152 | 30.6 | 105 | 18.3 |
| Hidalgo | 164 | 42.5 | 188 | 41.0 |
| Jalisco | 913 | 76.4 | 837 | 57.9 |
| México | 727 | 53.3 | 799 | 47.4 |
| Michoacán | 334 | 42.9 | 309 | 34.0 |
| Morelos | 169 | 68.4 | 142 | 48.7 |
| Nayarit | 136 | 70.0 | 105 | 50.2 |
| Nuevo León | 645 | 107.3 | 572 | 81.0 |
| Oaxaca | 200 | 29.9 | 187 | 23.9 |
| Puebla | 351 | 41.0 | 365 | 35.1 |
| Querétaro | 74 | 41.5 | 85 | 40.2 |
| Quintana Roo | 23 | 42.8 | 12 | 24.3 |
| San Luis Potosí | 256 | 59.5 | 244 | 49.3 |
| Sinaloa | 336 | 75.6 | 254 | 52.4 |
| Sonora | 412 | 116.4 | 333 | 85.1 |
| Tabasco | 153 | 65.9 | 151 | 62.2 |
| Tamaulipas | 450 | 98.0 | 371 | 70.2 |
| Tlaxcala | 74 | 43.9 | 65 | 33.3 |
| Veracruz | 685 | 54.8 | 667 | 45.7 |
| Yucatán | 282 | 77.7 | 245 | 61.5 |
| Zacatecas | 131 | 44.0 | 113 | 34.2 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 410-414

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro IX
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA[†]
EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 904 | 2.3 | 569 | 1.4 |
| Aguascalientes | 6 | 1.7 | 8 | 2.2 |
| Baja California | 14 | 1.5 | 10 | 1.3 |
| Baja California Sur | 4 | 1.3 | 2 | 1.5 |
| Campeche | 5 | 1.4 | 2 | 1.2 |
| Coahuila | 21 | 2.0 | 17 | 1.7 |
| Colima | 3 | 1.3 | 0.0 | |
| Chiapas | 17 | 1.5 | 8 | 0.5 |
| Chihuahua | 38 | 2.5 | 13 | 1.2 |
| Distrito Federal | 139 | 3.2 | 87 | 1.8 |
| Durango | 12 | 1.4 | 9 | 1.6 |
| Guanajuato | 36 | 1.8 | 23 | 1.4 |
| Guerrero | 15 | 1.1 | 9 | 0.5 |
| Hidalgo | 20 | 2.3 | 13 | 1.3 |
| Jalisco | 86 | 3.5 | 73 | 2.8 |
| México | 129 | 3.2 | 90 | 1.9 |
| Michoacán | 44 | 2.5 | 23 | 1.1 |
| Morelos | 11 | 1.6 | 3 | 0.2 |
| Nayarit | 7 | 1.6 | 4 | 1.0 |
| Nuevo León | 44 | 3.0 | 17 | 1.1 |
| Oaxaca | 14 | 0.7 | 18 | 1.0 |
| Puebla | 35 | 1.4 | 36 | 1.5 |
| Querétaro | 9 | 1.8 | 3 | 0.8 |
| Quintana Roo | 4 | 2.4 | 0.0 | |
| San Luis Potosí | 17 | 1.8 | 18 | 1.6 |
| Sinaloa | 27 | 2.9 | 5 | 0.5 |
| Sonora | 33 | 3.8 | 15 | 1.7 |
| Tabasco | 10 | 1.8 | 4 | 0.7 |
| Tamaulipas | 29 | 2.5 | 11 | 0.9 |
| Tlaxcala | 7 | 2.1 | 4 | 0.8 |
| Veracruz | 47 | 1.6 | 30 | 1.0 |
| Yucatán | 6 | 1.1 | 7 | 1.0 |
| Zacatecas | 15 | 2.0 | 7 | 1.0 |

* Tasa por 10 000 habitantes de 40 a 64 años

[†] Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro X
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA[†]
EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|-----------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 5,441 | 34.5 | 3,954 | 21.2 |
| Aguascalientes | 60 | 45.4 | 38 | 23.9 |
| Baja California | 77 | 26.7 | 55 | 16.9 |
| Baja California Sur | 20 | 36.0 | 9 | 14.6 |
| Campeche | 18 | 17.6 | 12 | 11.5 |
| Coahuila | 176 | 47.2 | 100 | 23.2 |
| Colima | 35 | 37.7 | 27 | 25.7 |
| Chiapas | 73 | 15.3 | 49 | 9.7 |
| Chihuahua | 179 | 38.0 | 100 | 18.8 |
| Distrito Federal | 763 | 45.2 | 665 | 28.8 |
| Durango | 134 | 50.4 | 61 | 20.7 |
| Guanajuato | 347 | 43.7 | 252 | 27.2 |
| Guerrero | 61 | 12.3 | 44 | 7.6 |
| Hidalgo | 79 | 20.5 | 87 | 19.0 |
| Jalisco | 506 | 42.3 | 418 | 28.9 |
| México | 560 | 41.1 | 494 | 29.3 |
| Michoacán | 273 | 35.0 | 220 | 24.2 |
| Morelos | 95 | 38.5 | 52 | 17.8 |
| Nayarit | 51 | 26.3 | 21 | 10.0 |
| Nuevo León | 227 | 37.8 | 160 | 22.7 |
| Oaxaca | 114 | 17.0 | 77 | 9.8 |
| Puebla | 254 | 29.7 | 179 | 17.2 |
| Querétaro | 67 | 37.6 | 43 | 20.3 |
| Quintana Roo | 13 | 24.2 | 10 | 20.3 |
| San Luis Potosí | 138 | 32.1 | 85 | 17.2 |
| Sinaloa | 177 | 39.9 | 73 | 15.0 |
| Sonora | 193 | 54.5 | 89 | 22.8 |
| Tabasco | 73 | 31.4 | 44 | 18.1 |
| Tamaulipas | 213 | 46.4 | 118 | 22.3 |
| Tlaxcala | 45 | 26.7 | 43 | 22.0 |
| Veracruz | 224 | 17.9 | 204 | 14.0 |
| Yucatán | 85 | 23.4 | 63 | 15.8 |
| Zacatecas | 111 | 37.3 | 62 | 18.8 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años.

[†] Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 490-492, 496

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XI
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN† EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 1 165 | 2.8 | 560 | 1.2 |
| Aguascalientes | 8 | 2.0 | 9 | 2.6 |
| Baja California | 41 | 4.5 | 14 | 1.5 |
| Baja California Sur | 9 | 6.3 | 2 | 0.7 |
| Campeche | 4 | 1.2 | 3 | 0.6 |
| Coahuila | 49 | 4.9 | 25 | 2.3 |
| Colima | 5 | 3.6 | 4 | 1.5 |
| Chiapas | 9 | 0.7 | 7 | 0.5 |
| Chihuahua | 71 | 5.2 | 37 | 2.4 |
| Distrito Federal | 139 | 3.2 | 64 | 1.2 |
| Durango | 25 | 3.0 | 8 | 0.9 |
| Guanajuato | 37 | 2.5 | 19 | 0.8 |
| Guerrero | 9 | 0.9 | 7 | 0.5 |
| Hidalgo | 12 | 0.9 | 14 | 1.2 |
| Jalisco | 89 | 3.4 | 53 | 1.7 |
| México | 76 | 1.5 | 49 | 1.1 |
| Michoacán | 42 | 2.2 | 22 | 0.9 |
| Morelos | 22 | 3.5 | 4 | 0.6 |
| Nayarit | 17 | 3.4 | 5 | 1.1 |
| Nuevo León | 80 | 5.0 | 34 | 2.1 |
| Oaxaca | 15 | 0.9 | 11 | 0.5 |
| Puebla | 29 | 1.1 | 16 | 0.7 |
| Querétaro | 3 | 0.6 | 4 | 0.7 |
| Quintana Roo | 3 | 2.2 | 1 | 1.1 |
| San Luis Potosí | 18 | 1.6 | 10 | 0.7 |
| Sinaloa | 88 | 7.3 | 22 | 1.9 |
| Sonora | 85 | 9.2 | 32 | 2.6 |
| Tabasco | 14 | 1.7 | 5 | 0.6 |
| Tamaulipas | 61 | 4.7 | 23 | 1.5 |
| Tlaxcala | 2 | 0.3 | 7 | 1.0 |
| Veracruz | 68 | 2.0 | 31 | 0.8 |
| Yucatán | 15 | 2.2 | 8 | 0.5 |
| Zacatecas | 20 | 3.4 | 10 | 1.1 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años.

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN† EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|-------|---------|------|
| | Número | Tasa* | Número | Tasa |
| Total | 2 159 | 13.7 | 920 | 4.9 |
| Aguascalientes | 18 | 13.6 | 20 | 12.6 |
| Baja California | 64 | 22.2 | 29 | 8.9 |
| Baja California Sur | 18 | 32.4 | 1 | 1.6 |
| Campeche | 12 | 11.7 | 2 | 1.9 |
| Coahuila | 89 | 23.9 | 36 | 8.4 |
| Colima | 12 | 12.9 | 5 | 4.8 |
| Chiapas | 31 | 6.5 | 12 | 2.4 |
| Chihuahua | 130 | 27.6 | 45 | 8.5 |
| Distrito Federal | 214 | 12.7 | 124 | 5.4 |
| Durango | 38 | 14.3 | 23 | 7.8 |
| Guanajuato | 89 | 11.2 | 42 | 4.5 |
| Guerrero | 28 | 5.6 | 8 | 1.4 |
| Hidalgo | 19 | 4.9 | 11 | 2.4 |
| Jalisco | 213 | 17.8 | 95 | 6.6 |
| México | 106 | 7.8 | 60 | 3.6 |
| Michoacán | 122 | 15.7 | 45 | 4.9 |
| Morelos | 29 | 11.7 | 12 | 4.1 |
| Nayarit | 42 | 21.6 | 8 | 3.8 |
| Nuevo León | 168 | 28.0 | 84 | 11.9 |
| Oaxaca | 37 | 5.5 | 11 | 1.4 |
| Puebla | 57 | 6.7 | 20 | 1.9 |
| Querétaro | 8 | 4.5 | 6 | 2.8 |
| Quintana Roo | 7 | 13.0 | 1 | 2.0 |
| San Luis Potosí | 43 | 10.0 | 26 | 5.3 |
| Sinaloa | 132 | 29.7 | 31 | 6.4 |
| Sonora | 123 | 34.8 | 33 | 8.4 |
| Tabasco | 17 | 7.3 | 6 | 2.5 |
| Tamaulipas | 91 | 19.8 | 33 | 6.2 |
| Tlaxcala | 13 | 7.7 | 4 | 2.1 |
| Veracruz | 99 | 7.9 | 57 | 3.9 |
| Yucatán | 44 | 12.1 | 11 | 2.8 |
| Zacatecas | 46 | 15.4 | 19 | 5.8 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años.

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9), causas 162

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 1990
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XIII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD
POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN†
EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD,
SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 6 839 | 11.0 | 3,416 | 5.5 |
| Aguascalientes | 47 | 8.5 | 23 | 3.8 |
| Baja California | 331 | 22.9 | 117 | 7.8 |
| Baja California Sur | 66 | 28.4 | 21 | 10.9 |
| Campeche | 51 | 10.9 | 22 | 4.8 |
| Coahuila | 274 | 17.4 | 138 | 9.5 |
| Colima | 56 | 15.7 | 19 | 5.5 |
| Chiapas | 154 | 6.5 | 91 | 4.3 |
| Chihuahua | 394 | 18.2 | 209 | 11.1 |
| Distrito Federal | 793 | 12.5 | 370 | 5.3 |
| Durango | 104 | 11.2 | 45 | 4.6 |
| Guanajuato | 226 | 8.6 | 121 | 4.0 |
| Guerrero | 118 | 6.3 | 79 | 3.9 |
| Hidalgo | 94 | 6.2 | 47 | 2.7 |
| Jalisco | 430 | 10.9 | 235 | 6.0 |
| México | 714 | 9.4 | 377 | 5.1 |
| Michoacán | 207 | 7.7 | 112 | 4.2 |
| Morelos | 99 | 9.8 | 42 | 3.9 |
| Nayarit | 58 | 7.5 | 39 | 6.6 |
| Nuevo León | 453 | 17.3 | 193 | 7.7 |
| Oaxaca | 156 | 7.0 | 98 | 3.7 |
| Puebla | 207 | 7.3 | 122 | 3.9 |
| Querétaro | 76 | 9.6 | 28 | 4.6 |
| Quintana Roo | 43 | 10.2 | 14 | 5.1 |
| San Luis Potosí | 97 | 6.9 | 85 | 6.2 |
| Sinaloa | 228 | 13.9 | 119 | 8.6 |
| Sonora | 339 | 22.1 | 143 | 9.7 |
| Tabasco | 80 | 6.8 | 39 | 3.6 |
| Tamaulipas | 289 | 15.3 | 140 | 7.8 |
| Tlaxcala | 33 | 7.4 | 11 | 1.8 |
| Veracruz | 430 | 8.7 | 217 | 4.4 |
| Yucatán | 117 | 10.5 | 54 | 5.1 |
| Zacatecas | 75 | 8.9 | 46 | 5.3 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XIV
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD
POR ENFERMEDAD ISQUÉMICA DEL CORAZÓN†
EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD,
SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|-------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 16 100 | 72.9 | 16,082 | 62.7 |
| Aguascalientes | 138 | 73.3 | 119 | 52.5 |
| Baja California | 514 | 110.4 | 426 | 84.2 |
| Baja California Sur | 76 | 94.2 | 54 | 63.5 |
| Campeche | 113 | 75.4 | 87 | 57.0 |
| Coahuila | 491 | 89.4 | 453 | 74.7 |
| Colima | 109 | 82.6 | 128 | 89.3 |
| Chiapas | 341 | 50.2 | 283 | 40.2 |
| Chihuahua | 756 | 105.7 | 661 | 84.0 |
| Distrito Federal | 2,013 | 88.2 | 2,602 | 85.7 |
| Durango | 261 | 71.4 | 207 | 50.2 |
| Guanajuato | 688 | 65.0 | 663 | 53.0 |
| Guerrero | 317 | 45.8 | 296 | 37.5 |
| Hidalgo | 244 | 46.0 | 273 | 45.3 |
| Jalisco | 1,254 | 81.4 | 1,262 | 68.7 |
| México | 1,403 | 64.7 | 1,637 | 61.9 |
| Michoacán | 632 | 60.3 | 562 | 47.3 |
| Morelos | 230 | 59.9 | 231 | 51.4 |
| Nayarit | 205 | 79.3 | 175 | 62.8 |
| Nuevo León | 824 | 94.2 | 843 | 83.4 |
| Oaxaca | 402 | 44.7 | 376 | 36.9 |
| Puebla | 581 | 51.3 | 598 | 43.3 |
| Querétaro | 156 | 61.5 | 162 | 53.9 |
| Quintana Roo | 59 | 61.5 | 54 | 59.0 |
| San Luis Potosí | 418 | 71.0 | 396 | 60.4 |
| Sinaloa | 523 | 84.7 | 478 | 73.3 |
| Sonora | 609 | 110.8 | 488 | 85.5 |
| Tabasco | 225 | 69.2 | 193 | 55.4 |
| Tamaulipas | 630 | 95.4 | 607 | 81.6 |
| Tlaxcala | 107 | 47.3 | 66 | 25.4 |
| Veracruz | 1,143 | 66.2 | 1,081 | 54.8 |
| Yucatán | 397 | 86.9 | 385 | 75.6 |
| Zacatecas | 241 | 64.1 | 236 | 55.3 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas I20-I25

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XV
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA†
EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 999 | 1.9 | 763 | 1.3 |
| Aguascalientes | 15 | 3.4 | 8 | 1.7 |
| Baja California | 19 | 1.6 | 13 | 1.1 |
| Baja California Sur | 3 | 1.2 | 2 | 1.6 |
| Campeche | 6 | 2.3 | 3 | 1.0 |
| Coahuila | 32 | 2.5 | 7 | 0.5 |
| Colima | 1 | 0.2 | 2 | 0.7 |
| Chiapas | 27 | 1.3 | 32 | 1.5 |
| Chihuahua | 47 | 2.4 | 31 | 2.0 |
| Distrito Federal | 108 | 2.0 | 77 | 1.1 |
| Durango | 22 | 2.7 | 13 | 1.3 |
| Guanajuato | 53 | 2.3 | 31 | 1.1 |
| Guerrero | 18 | 1.2 | 14 | 0.9 |
| Hidalgo | 20 | 1.1 | 14 | 1.0 |
| Jalisco | 80 | 2.3 | 70 | 1.8 |
| México | 131 | 2.0 | 133 | 1.8 |
| Michoacán | 45 | 2.0 | 31 | 1.4 |
| Morelos | 13 | 1.8 | 11 | 0.9 |
| Nayarit | 9 | 1.9 | 5 | 0.8 |
| Nuevo León | 39 | 1.9 | 34 | 1.6 |
| Oaxaca | 25 | 1.3 | 12 | 0.5 |
| Puebla | 28 | 1.1 | 37 | 1.2 |
| Querétaro | 12 | 1.2 | 9 | 1.3 |
| Quintana Roo | 6 | 2.0 | 4 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 20 | 1.5 | 15 | 1.0 |
| Sinaloa | 36 | 2.9 | 13 | 1.0 |
| Sonora | 33 | 3.1 | 21 | 1.6 |
| Tabasco | 12 | 1.0 | 9 | 1.2 |
| Tamaulipas | 33 | 2.3 | 16 | 0.8 |
| Tlaxcala | 2 | 0.2 | 8 | 1.6 |
| Veracruz | 77 | 1.9 | 68 | 1.6 |
| Yucatán | 10 | 0.9 | 8 | 0.6 |
| Zacatecas | 17 | 2.3 | 12 | 1.3 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XVI
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR
ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA†
EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO
Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 7 976 | 36.1 | 5 855 | 22.8 |
| Aguascalientes | 102 | 54.2 | 100 | 44.1 |
| Baja California | 126 | 27.1 | 82 | 16.2 |
| Baja California Sur | 37 | 45.8 | 9 | 10.6 |
| Campeche | 39 | 26.0 | 16 | 10.5 |
| Coahuila | 216 | 39.3 | 113 | 18.6 |
| Colima | 46 | 34.9 | 34 | 23.7 |
| Chiapas | 136 | 20.0 | 120 | 17.1 |
| Chihuahua | 348 | 48.7 | 175 | 22.2 |
| Distrito Federal | 790 | 34.6 | 696 | 22.9 |
| Durango | 177 | 48.4 | 130 | 31.5 |
| Guanajuato | 505 | 47.7 | 351 | 28.1 |
| Guerrero | 147 | 21.2 | 85 | 10.8 |
| Hidalgo | 131 | 24.7 | 129 | 21.4 |
| Jalisco | 739 | 48.0 | 601 | 32.7 |
| México | 932 | 43.0 | 813 | 30.7 |
| Michoacán | 456 | 43.5 | 311 | 26.2 |
| Morelos | 169 | 44.0 | 89 | 19.8 |
| Nayarit | 104 | 40.2 | 60 | 21.5 |
| Nuevo León | 302 | 34.5 | 222 | 22.0 |
| Oaxaca | 186 | 20.7 | 136 | 13.4 |
| Puebla | 300 | 26.5 | 236 | 17.1 |
| Querétaro | 112 | 44.2 | 91 | 30.3 |
| Quintana Roo | 25 | 26.1 | 16 | 17.5 |
| San Luis Potosí | 195 | 33.1 | 141 | 21.5 |
| Sinaloa | 265 | 42.9 | 114 | 17.5 |
| Sonora | 239 | 43.5 | 97 | 17.0 |
| Tabasco | 104 | 32.0 | 81 | 23.2 |
| Tamaulipas | 193 | 29.2 | 128 | 17.2 |
| Tlaxcala | 73 | 32.3 | 65 | 25.0 |
| Veracruz | 411 | 23.8 | 420 | 21.3 |
| Yucatán | 138 | 30.2 | 66 | 13.0 |
| Zacatecas | 233 | 61.9 | 128 | 30.0 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas J40-J44

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
Proyecciones de población 1995-2050. Conapo 1998

Cuadro XVII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN† EN POBLACIÓN DE 40 A 64 AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 1 281 | 2.2 | 634 | 1.0 |
| Aguascalientes | 6 | 0.9 | 6 | 1.5 |
| Baja California | 40 | 2.5 | 21 | 1.6 |
| Baja California Sur | 11 | 2.8 | 4 | 1.4 |
| Campeche | 9 | 2.3 | 6 | 1.1 |
| Coahuila | 58 | 4.2 | 17 | 1.0 |
| Colima | 12 | 4.9 | 5 | 0.8 |
| Chiapas | 19 | 0.9 | 32 | 1.4 |
| Chihuahua | 61 | 3.1 | 34 | 1.5 |
| Distrito Federal | 95 | 1.6 | 74 | 0.9 |
| Durango | 23 | 2.3 | 12 | 1.4 |
| Guanajuato | 51 | 2.0 | 36 | 1.2 |
| Guerrero | 18 | 1.1 | 20 | 1.0 |
| Hidalgo | 15 | 1.3 | 7 | 0.4 |
| Jalisco | 80 | 2.1 | 56 | 1.4 |
| México | 117 | 1.5 | 60 | 0.7 |
| Michoacán | 51 | 2.2 | 23 | 1.0 |
| Morelos | 16 | 1.5 | 11 | 1.2 |
| Nayarit | 23 | 4.7 | 1 | 0.3 |
| Nuevo León | 95 | 4.1 | 35 | 1.4 |
| Oaxaca | 22 | 1.1 | 12 | 0.4 |
| Puebla | 25 | 1.0 | 17 | 0.6 |
| Querétaro | 8 | 1.0 | 5 | 0.7 |
| Quintana Roo | 9 | 1.9 | 2 | 0.7 |
| San Luis Potosí | 26 | 1.9 | 17 | 1.1 |
| Sinaloa | 88 | 4.9 | 17 | 0.9 |
| Sonora | 93 | 7.0 | 23 | 1.8 |
| Tabasco | 26 | 3.1 | 6 | 0.6 |
| Tamaulipas | 79 | 5.1 | 19 | 0.9 |
| Tlaxcala | 4 | 0.6 | 4 | 1.0 |
| Veracruz | 71 | 1.5 | 40 | 0.8 |
| Yucatán | 17 | 1.7 | 5 | 0.4 |
| Zacatecas | 13 | 1.6 | 7 | 0.7 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 40 a 64 años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
Proyecciones de población 1995 - 2050. Conapo 1998

Cuadro XVIII
DEFUNCIONES Y TASA* DE MORTALIDAD POR CÁNCER DE TRÁQUEA BRONQUIOS Y PULMÓN† EN POBLACIÓN DE 65 Y MÁS AÑOS DE EDAD, SEGÚN SEXO Y ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Hombres | | Mujeres | |
|---------------------|---------|------|---------|------|
| | Número | Tasa | Número | Tasa |
| Total | 2 829 | 12.8 | 1 283 | 5.0 |
| Aguascalientes | 26 | 13.8 | 20 | 8.8 |
| Baja California | 78 | 16.8 | 38 | 7.5 |
| Baja California Sur | 28 | 34.7 | 7 | 8.2 |
| Campeche | 12 | 8.0 | 7 | 4.6 |
| Coahuila | 109 | 19.8 | 34 | 5.6 |
| Colima | 20 | 15.2 | 9 | 6.3 |
| Chiapas | 60 | 8.8 | 27 | 3.8 |
| Chihuahua | 137 | 19.2 | 79 | 10.0 |
| Distrito Federal | 226 | 9.9 | 152 | 5.0 |
| Durango | 64 | 17.5 | 13 | 3.2 |
| Guanajuato | 122 | 11.5 | 64 | 5.1 |
| Guerrero | 46 | 6.6 | 22 | 2.8 |
| Hidalgo | 27 | 5.1 | 14 | 2.3 |
| Jalisco | 257 | 16.7 | 142 | 7.7 |
| México | 169 | 7.8 | 82 | 3.1 |
| Michoacán | 139 | 13.3 | 72 | 6.1 |
| Morelos | 36 | 9.4 | 18 | 4.0 |
| Nayarit | 53 | 20.5 | 21 | 7.5 |
| Nuevo León | 197 | 22.5 | 66 | 6.5 |
| Oaxaca | 45 | 5.0 | 21 | 2.1 |
| Puebla | 56 | 4.9 | 42 | 3.0 |
| Querétaro | 21 | 8.3 | 16 | 5.3 |
| Quintana Roo | 5 | 5.2 | 7 | 7.6 |
| San Luis Potosí | 77 | 13.1 | 27 | 4.1 |
| Sinaloa | 204 | 33.0 | 44 | 6.7 |
| Sonora | 168 | 30.6 | 58 | 10.2 |
| Tabasco | 40 | 12.3 | 16 | 4.6 |
| Tamaulipas | 122 | 18.5 | 42 | 5.6 |
| Tlaxcala | 4 | 1.8 | 5 | 1.9 |
| Veracruz | 183 | 10.6 | 80 | 4.1 |
| Yucatán | 41 | 9.0 | 14 | 2.7 |
| Zacatecas | 57 | 15.1 | 24 | 5.6 |

* Tasa por 10,000 habitantes de 65 y más años

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-10), causas C33, C34

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población por grupos quinquenales reportada por el Conapo para el año 2000

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA. 2000
Proyecciones de población 1995 - 2050. Conapo 1998

Cuadro XIX
TASAS* DE MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS† Y SEXO EN POBLACIÓN MAYOR DE 40 AÑOS DE EDAD SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 1990

| Entidad Federativa | Enfermedad Isquémica del Corazón CIE-9 (410 - 414) | | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica CIE-9 (490 - 492, 496) | | Cáncer de Tráquea Bronquios y Pulmón CIE-9 (162) | |
|--------------------------|---|---------|---|---------|---|---------|
| | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| Estados Unidos Mexicanos | 15.1 | 9.2 | 4.9 | 3.0 | 3.3 | 1.3 |
| Aguascalientes | 13.1 | 8.8 | 5.9 | 3.9 | 3.1 | 3.0 |
| Baja California | 30.9 | 14.5 | 3.7 | 2.4 | 5.4 | 2.0 |
| Baja California Sur | 20.4 | 7.5 | 5.7 | 2.2 | 7.3 | 1.2 |
| Campeche | 11.4 | 7.7 | 3.1 | 1.6 | 2.3 | 1.1 |
| Coahuila | 22.1 | 11.7 | 6.1 | 3.4 | 5.7 | 2.4 |
| Colima | 17.2 | 7.9 | 4.9 | 2.6 | 2.6 | 1.8 |
| Chiapas | 8.6 | 5.3 | 2.3 | 1.4 | 1.0 | 0.6 |
| Chihuahua | 26.2 | 14.2 | 5.8 | 2.5 | 6.4 | 2.6 |
| Distrito Federal | 19.1 | 13.2 | 6.6 | 3.9 | 3.3 | 1.3 |
| Durango | 13.7 | 9.0 | 6.3 | 2.8 | 4.0 | 1.6 |
| Guanajuato | 12.4 | 7.0 | 5.7 | 3.4 | 2.3 | 1.1 |
| Guerrero | 6.8 | 4.0 | 2.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 |
| Hidalgo | 11.0 | 7.2 | 3.5 | 2.8 | 1.4 | 1.2 |
| Jalisco | 16.8 | 10.5 | 6.4 | 4.5 | 4.0 | 1.9 |
| México | 11.5 | 8.0 | 6.1 | 4.2 | 2.0 | 1.1 |
| Michoacán | 10.1 | 6.3 | 5.2 | 3.2 | 3.2 | 1.3 |
| Morelos | 15.0 | 7.3 | 5.0 | 2.0 | 3.4 | 0.7 |
| Nayarit | 16.1 | 9.2 | 3.7 | 1.5 | 4.7 | 1.2 |
| Nuevo León | 27.3 | 15.1 | 5.6 | 2.9 | 6.1 | 2.5 |
| Oaxaca | 6.7 | 4.8 | 2.3 | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
| Puebla | 9.5 | 5.9 | 4.2 | 2.8 | 1.7 | 0.6 |
| Querétaro | 13.4 | 6.8 | 5.0 | 2.4 | 0.9 | 0.9 |
| Quintana Roo | 9.7 | 2.8 | 3.7 | 2.0 | 2.3 | 0.6 |
| San Luis Potosí | 12.7 | 7.5 | 4.3 | 2.8 | 2.2 | 1.1 |
| Sinaloa | 16.9 | 10.2 | 5.5 | 1.8 | 8.1 | 1.9 |
| Sonora | 30.8 | 15.0 | 7.7 | 3.3 | 9.2 | 3.1 |
| Tabasco | 11.9 | 10.1 | 4.2 | 2.2 | 2.2 | 0.7 |
| Tamaulipas | 22.8 | 12.2 | 6.2 | 2.8 | 5.4 | 1.9 |
| Tlaxcala | 8.4 | 4.5 | 3.8 | 2.8 | 1.1 | 1.4 |
| Veracruz | 11.7 | 7.9 | 2.7 | 1.9 | 2.2 | 1.0 |
| Yucatán | 15.9 | 8.8 | 2.8 | 2.1 | 2.3 | 1.0 |
| Zacatecas | 9.3 | 6.3 | 5.3 | 2.6 | 3.5 | 1.5 |

* Tasa por 10 000 habitantes mayores de 40 años de edad

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 9)

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población reportada por el Conapo para el año 2000

Cuadro XX
TASAS* DE MORTALIDAD POR CAUSAS SELECCIONADAS† Y SEXO EN POBLACIÓN MAYOR DE 40 AÑOS DE EDAD SEGÚN ENTIDAD FEDERATIVA. MÉXICO, 2000

| Entidad Federativa | Enfermedad Isquémica del Corazón CIE-10 (I20 - I25) | | Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica CIE-10 (J40 - J44) | | Cancer de Tráquea Bronquios y Pulmón CIE-10 (C33, C34) | |
|--------------------------|--|---------|---|---------|---|---------|
| | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres | Hombres | Mujeres |
| Estados Unidos Mexicanos | 15.2 | 9.9 | 4.8 | 3.1 | 2.8 | 1.2 |
| Aguascalientes | 13.5 | 8.0 | 7.3 | 5.4 | 2.3 | 1.5 |
| Baja California | 27.1 | 14.0 | 3.7 | 2.3 | 3.7 | 1.7 |
| Baja California Sur | 27.0 | 12.2 | 5.4 | 1.6 | 6.5 | 1.8 |
| Campeche | 15.3 | 9.9 | 3.5 | 1.6 | 2.3 | 1.4 |
| Coahuila | 21.5 | 13.5 | 5.4 | 2.2 | 4.6 | 1.3 |
| Colima | 19.8 | 12.6 | 3.8 | 2.8 | 3.8 | 1.5 |
| Chiapas | 10.0 | 6.9 | 2.8 | 2.8 | 1.5 | 1.5 |
| Chihuahua | 24.7 | 15.3 | 6.5 | 3.2 | 4.1 | 2.2 |
| Distrito Federal | 18.0 | 12.2 | 4.7 | 3.0 | 2.1 | 1.2 |
| Durango | 14.9 | 8.1 | 6.4 | 4.1 | 3.5 | 1.1 |
| Guanajuato | 12.5 | 8.3 | 6.2 | 3.5 | 2.5 | 1.3 |
| Guerrero | 9.3 | 6.6 | 2.8 | 1.6 | 1.3 | 1.0 |
| Hidalgo | 9.2 | 7.0 | 3.6 | 2.8 | 1.2 | 0.6 |
| Jalisco | 15.9 | 10.7 | 6.3 | 4.5 | 3.1 | 1.7 |
| México | 13.0 | 9.5 | 5.5 | 4.2 | 1.9 | 0.8 |
| Michoacán | 12.0 | 7.7 | 5.6 | 3.4 | 2.8 | 1.2 |
| Morelos | 12.6 | 7.7 | 5.3 | 2.7 | 2.1 | 1.0 |
| Nayarit | 14.6 | 10.3 | 4.9 | 2.7 | 4.5 | 0.8 |
| Nuevo León | 21.7 | 13.3 | 4.5 | 3.0 | 4.8 | 1.5 |
| Oaxaca | 9.5 | 6.7 | 2.9 | 1.7 | 1.2 | 0.6 |
| Puebla | 10.1 | 7.0 | 3.3 | 2.5 | 1.1 | 0.7 |
| Querétaro | 13.3 | 7.7 | 5.6 | 3.9 | 1.7 | 1.0 |
| Quintana Roo | 13.1 | 8.8 | 3.8 | 2.7 | 2.0 | 1.2 |
| San Luis Potosí | 11.6 | 9.9 | 4.3 | 2.8 | 2.6 | 1.2 |
| Sinaloa | 17.8 | 12.1 | 5.8 | 2.3 | 7.0 | 1.4 |
| Sonora | 26.1 | 15.0 | 5.7 | 2.7 | 7.3 | 2.0 |
| Tabasco | 12.6 | 8.1 | 4.1 | 3.0 | 2.9 | 0.9 |
| Tamaulipas | 20.4 | 13.2 | 4.1 | 2.3 | 4.8 | 1.3 |
| Tlaxcala | 8.5 | 3.7 | 3.5 | 3.4 | 0.7 | 0.6 |
| Veracruz | 13.0 | 8.4 | 3.5 | 3.1 | 2.1 | 0.9 |
| Yucatán | 15.9 | 10.8 | 3.6 | 1.8 | 1.9 | 0.5 |
| Zacatecas | 12.5 | 8.9 | 7.5 | 3.9 | 2.5 | 1.1 |

* Tasa por 10,000 habitantes mayores de 40 años de edad

† Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE 10)

Fuente: Base de datos de Mortalidad. INEGI/SSA

Nota: Las defunciones reportadas corresponden sólo a la población residente en el país.

Tasa estandarizada a partir de la estructura de la población reportada por el Conapo para el año 2000